

－アマンタジン塩酸塩錠50mg・100mg「ZE」を お飲みになる患者様、そのご家族にお伝えください－

服薬指導せん



医師又は薬剤師のみなさまへ

抗インフルエンザウイルス剤を投与された患者様に「異常な行動」が認められたとの報告がございます。

つきましては、インフルエンザの患者様に『アマンタジン塩酸塩錠50mg・100mg「ZE」』を投与する際には、異常な行動による事故を防止するために、以下の点につきまして、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

- 本剤を服用された患者様で「異常な行動」が発現するおそれがあります。
- 自宅療養中に窓から飛び降りるなどの異常行動が依然として起きているため、玄関や部屋の窓の施錠を行うようご説明ください。
- 自宅において療養を行う場合、保護者の方等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮することを患者様・ご家族に対してご説明ください。

本剤の実際の使用に際し、詳細は製品添付文書等をご参照ください。



アマンタジン塩酸塩錠50mg・100mg「ZE」を服用される 患者様・ご家族・周囲の方々へのお願い

インフルエンザ治療薬を服用した患者様で、異常行動などの精神・神経症状がみられたことが報告されていますが、異常行動による万が一の事故を防止するための予防的な対応として、アマンタジン塩酸塩錠50mg・100mg「ZE」による治療が開始された後、ご自宅にて療養を行う場合は、次のことにご配慮ください。

- 異常行動の発現のおそれがありますので、保護者の方等は、お子様が一人にならないようにご配慮をお願いします。
- 服用してもしなくても住居外へ飛び出す等の異常行動が起きたケースもありますので、玄関や部屋の窓の施錠を確実にを行う等ご留意ください。
- インフルエンザウイルスによるインフルエンザ脳症などでも、同じような異常行動などの症状があらわれることがあります。インフルエンザ感染症と診断され治療を開始した後は、アマンタジン塩酸塩錠50mg・100mg「ZE」を服用していても、異常行動に十分に注意してください。
- アマンタジン塩酸塩錠50mg・100mg「ZE」は A 型インフルエンザウイルス感染症のみに効果があります。

< 異常行動などの精神・神経症状とは >

普段と違うとつびな行動をとる、興奮して暴れまわる、訳のわからないことを言う、幻覚が見える等。

その他、何か気になることがあれば医師、薬剤師にご相談ください。

連絡先（医療機関・薬局）