

# ベザフィブラー<sup>ト</sup>徐放錠100mg・200mg「ZE」

## を服用される患者さんへ

このお薬は、高脂血症の治療薬です。

血液中の脂質代謝異常を改善し、コレステロールや中性脂肪を減らします。

ベザフィブラー<sup>ト</sup>徐放錠 100mg「ZE」



ベザフィブラー<sup>ト</sup>徐放錠 200mg「ZE」



主治医または薬剤師に指示された  
用法・用量を守ってください。

- 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。  
ただし、次に飲む時間が近い場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばしてください。  
絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 誤って多く飲んだ場合は、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。
- 指示なしに、ご自分の判断で飲むのを止めないでください。

## 医師や薬剤師に伝えましょう。

以下の項目に当てはまる方は、このお薬をお飲みになる前に、医師や薬剤師にお伝えください。

- 人工透析をしている。
- 現在、腎臓の病気にかかっている。
- これまでに腎臓の病気にかかったことがある。
- 健康診断などで腎臓の検査値に異常があるといわれた。
- アレルギー体質である（特に、お薬でアレルギーをおこしたことがある）。
- 妊婦または妊娠している可能性がある。
- 授乳中である。

お薬は効果と副作用の両面を持ち合わせています。  
副作用がみられても早期に発見し適切な処置を行えば大事に至ることはほとんどありません。  
主治医または薬剤師の指示に従い、ただしく飲みましょう。

## このお薬でおこることが知られている副作用

### おうもんきんゆうかいしじょう 横紋筋融解症

- 筋肉の副作用です。
- 次のような症状のいくつかが同じ時期にみられれば「横紋筋融解症」の可能性があります。  
ただちに服用を止めて、すぐに主治医または薬剤師に連絡してください。

#### 筋肉が痛い



手足のしびれ・けいれん

#### 手足に力が入らない



歩行困難など

#### 尿の色が濃い (赤褐色になる)



## アナフィラキシー様症状

- アレルギー反応の副作用です。
- 次のような症状があらわれたら「アナフィラキシー様症状」の可能性があります。  
服用をやめて、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。

眼と口唇のはれ しゃがれ声 息苦しい じんましん

判断力の低下 ふらつき からだがだるい など

このほかにもお薬を飲んで体調がおかしいと感じたら主治医または薬剤師に相談ください。

施設名：