


レボフロキサシン錠

250mg・500mg「ZE」


を服用される患者さんへ



指導箋は 1 枚ずつはがしてご使用ください。

レボフロキサシン錠 250mg「ZE」・500mg「ZE」を ご使用される先生方へ

レボフロキサシンは濃度依存性の抗菌薬であり、PK/PD 理論による MPC（耐性菌出現阻止濃度）と MSW（耐性菌選択濃度域）のパラメータを考慮し、1日1回の投与となっています。
適正使用の観点から患者さんに1日1回の服用の指導をお願いします。



レボフロキサシンは濃度依存性に殺菌作用を示すため、 C_{max} を上げることで治療効果の向上が期待できます。

レボフロキサシン錠 250mg「ZE」・500mg「ZE」を 服用される患者さんへ

レボフロキサシン錠
250mg「ZE」



レボフロキサシン錠
500mg「ZE」



このおくすりには、感染症の原因である細菌の増殖をおさえ、殺菌する働きがあります。本紙をよくお読みいただき、正しく服用しましょう。

服用にあたってのお願い

主治医または薬剤師の指示を守って服用してください。

レボフロキサシン錠 250mg「ZE」・500mg「ZE」は「**1日1回**」服用することで、感染症の原因菌を速く消失させ、症状を改善することが期待できます。

必ず1日1回で服用してください

裏面もご覧ください→

服用にあたっての注意事項

- このお薬は主治医または薬剤師の指示どおり服用しなかった場合、治療効果が低下するばかりではなく、原因菌がこの薬の効かない菌に変化する可能性もあります。

- 飲み忘れに気づいた場合は、できるだけ早く服用してください。
ただし、次の服用時間に近い場合は、忘れた分は服用せず、次回から服用するようにしてください。



絶対に2回分をまとめて1度に服用しないでください。

- 誤って多く服用した場合は、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。

- 主治医または薬剤師の指示なしに、自分の判断で量や回数を変更したり、服用を中止しないでください。

おくすりについてわからないこと、服用中に気になる症状を感じられましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

主治医または薬剤師の連絡先