

医師又は薬剤師の皆様へ

ゾルピデム酒石酸塩錠「ZE」を服用される患者様へお伝えください

本剤投与開始時に、過去に本剤により以下のような睡眠中の異常行動の発現がなかったか(周囲からの指摘がなかったか、覚醒前後で物が散乱している等状況が変わっていたことがなかった等)を患者様やそのご家族に確認いただき、もし異常行動が認められていたら投与しないでください。また、本剤投与中の診察時にも、本剤による同様の睡眠中異常行動の発現を確認いただき、もし異常行動が認められた場合は投与を中止してください。

- 屋内や屋外を歩き回る
- 車を運転する
- 料理や食事をする
- 電話をかける
- 暴れたり大声を出したりする

など

加えて、本剤を処方する全ての患者様に、異常行動が重篤な自傷・他傷行為、事故等に至るおそれがある旨をご説明ください。なお、睡眠中に上記のような異常行動(睡眠随伴症状等)が起こった場合は速やかに医師・薬剤師へ連絡するよう患者様やそのご家族にご指導をお願いいたします。

全星薬品株式会社

全星薬品工業株式会社

ゾルピデム酒石酸塩錠「ZE」を服用される患者様へ



このお薬は不眠症の治療剤です。

服用の際は下記の注意事項をお守りください

- 必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
- 寝る直前に服用してください。服用する前に寝る支度を全てすませておきましょう。
- 一度寝てから、短時間後にまた起きて、仕事をするなどの予定があるときは、服用しないでください。
- この薬を服用して眠っている時に突然おきあがり、目が覚めているかのように歩き回ったりするなどの不適切な行動や覚醒前後で物が散乱している等状況が変わっていた、あるいは指摘された場合は、必ず医師または薬剤師にご相談ください。



- ふうつきや眠気、発疹などの症状がおきる可能性があります。気になる症状があれば、医師または薬剤師にご相談ください。
- このお薬を服用する前後は、アルコール類を飲まないでください。
- 服用後、十分目が覚めていない時は、自動車の運転等をしないでください。
- 自分の判断で、お薬の量を増やしたり減らしたりしないで、必ず医師または薬剤師にご相談ください。

このお薬の保管方法

- 直射日光と湿気を避けて室温で保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。親、兄弟姉妹、友人にもあげたり、もらったりしないでください。余ったお薬の処分方法については医療機関や薬局にご相談ください。

施設名